

TEST Z METOKLOPRAMIDEM

TEST Z MTC - test z metoklopramidem. Polega na podaniu pacjentowi 10 mg metoklopramidu doustnie w formie tabletki. Pobranie krwi **na czczo**, po **60** minutach oraz po **120** minutach - oznaczenie w próbkach stężenia prolaktyny. Test wykonuje się przy wartościach prolaktyny **<150 ng/dL**.

OZNACZENIE STĘŻENIA PROLAKTYNY PO 2 GODZINACH OD PODANIA METOKLOPRAMIDU

2-6 x wzrost stężenia PRL
względem wartości wyjściowej
uzyskanej na czczo

WYNIK PRAWIDŁOWY

> 6 x wzrost stężenia PRL względem
wartości wyjściowej uzyskanej na czczo

**HIPERPROLAKTYNEMIA
CZYNNOŚCIOWA**

brak zmian lub **niewielkie <2 x** zmiany
stężenia PRL względem wartości
wyjściowej uzyskanej na czczo

GUZ PRZYSADKI
(prolactinoma) lub zmiany w okolicy
**PODWZGÓRZOWO-
PRZYSADKOWEJ**

Test z metoklopramidem jest badaniem pomocniczym, do wystawienia pełnej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie wywiadu medycznego, badań obrazowych.